

Calendrier des évaluations pour le schéma posologique chronique (cohorte adulte uniquement)				
	Visite de sélection au centre	Visite au centre ou à distance (si possible) Mensuelle	Visite au centre ou à distance (si possible) Tous les trois mois (sauf si elle se chevauche avec la visite annuelle au centre)	Visite au centre Mois 12 et 24 de l'étude
Acquisition d'imagerie	<ul style="list-style-type: none"> <li>• TDM à faible dose du corps entier (hormis la tête)</li> <li>• Radiographies (main/poignet et genou)**</li> </ul>			<ul style="list-style-type: none"> <li>• TDM à faible dose du corps entier (hormis la tête)</li> </ul>
Examen physique	✓			✓
Analyse de sang/d'urine	✓	✓*	✓	✓
Questionnaires/ auto-évaluations	✓			✓
Calendrier des évaluations sans administration de médicament (cohorte pédiatrique uniquement)				
	Évaluation et contacts téléphoniques mensuels Mois 6, 18 et 24		Visite au centre Mois 12	
Acquisition d'imagerie			<ul style="list-style-type: none"> <li>• Radiographies (main/poignet et genou)**</li> <li>• TDM à faible dose ***</li> </ul>	
Examen physique			✓	
Analyse de sang/d'urine			✓	
Calendrier des évaluations concernant le schéma posologique aigu pour les poussées admissibles (cohortes adulte et pédiatrique)				
	Visite au centre Sélection poussée/référence	Visites au centre ou à distance (si possible) Toutes les deux semaines jusqu'à la fin du traitement	Visite au centre Jour 84 de la poussée/fin de traitement	
Acquisition d'imagerie	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Radiographies (main/poignet et genou)**</li> <li>• TDM à faible dose (site de poussée)***</li> <li>• IRM (site de poussée)****</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Radiographies (main/poignet et genou)**</li> <li>• TDM à faible dose (site de poussée)***</li> <li>• IRM (site de poussée)****</li> </ul>	
Examen physique	✓		✓	
Analyse de sang/d'urine	✓	✓	✓	
Questionnaires/ auto-évaluations	✓	✓	✓	

\*Uniquement test urinaire de grossesse pour les femmes susceptibles d'être enceintes.

\*\*Seulement pour les participants de moins de 18 ans ou bien dans la cohorte pédiatrique afin de mesurer la maturité squelettique

\*\*\*Les radiographies sont réalisées si le participant ne peut pas subir de TDM.

\*\*\*\*L'échographie est réalisée si le participant ne peut pas subir d'IRM.